

Bonjour,  
Après le fjord du Varanger, direction le plateau en longeant la Tana où j'ai observé une famille de Chouette épervière et dans le delta du Bécasseau de Temminck, une famille d'Huitrier-pie.  
Enfin sur le plateau, quelques espèces nordiques avec le Phalarope à bec étroit, l'Harelda boréale, le Chevalier sylvain et la Grive mauvis. Bonne journée  
Jean-Marc



323 - En longeant la rivière Tana



324 - Delta de la Tana





325 - Chouette épervière



326 - Juvénile de Chouette épervière



327 - Juvénile de Chouette épervière



328 - Juvénile de Chouette épervière





329 - Juvénile de Chouette épervière



330- Bécasseau de Temminck



331- Huitrier-pie



332- Huitrier-pie





333- Huitrier-pie



334- Huitrier-pie



335 - Plateau du Varanger



336 - Plateau du Varanger





337 - Plateau du Varanger



338 - Phalarope à bec étroit





339 - Phalarope à bec étroit



340 - Phalarope à bec étroit



341 - Phalarope à bec étroit



342 - Phalarope à bec étroit





343 - Phalarope à bec étroit



344 - Harelda boréale



345 - Harelda boréale



346 - Harelda boréale





347 - Chevalier sylvain



348 - Grive mauvis



349 - Grive mauvis